

iSGLT2 signifie

Inhibiteurs du Sodium-Glucose Co-Transporteur-2 (« gliflozines »)

Ces médicaments sont utilisés pour traiter la maladie rénale chronique, l'insuffisance cardiaque et le diabète en limitant les lésions organiques :



Cardiovasculaire

- Réduit le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire
- Baisse de la pression artérielle
- Élimine l'excès de liquide (diurèse)



Rein

- Préserve la fonction rénale existante, prévient ou ralentit la progression vers la défaillance rénale
- Indépendamment de ses bénéfices sur le contrôle de la glycémie



Métabolique

- Réduit la glycémie
- Risque faible d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang faible)
- Effet amaigrissant

Les inhibiteurs du SGLT2 et vous

Pourquoi vous a-t-on prescrit un inhibiteur du SGLT2 ? (Cochez toutes les cases applicables)

- ☐ Maladie rénale chronique
- ☐ Insuffisance cardiaque
- ☐ Diabète

Quand et comment prendre ce médicament ?

Les inhibiteurs du SGLT2 se prennent une fois par jour, la même dose, avant, pendant ou après le repas.

Avantages de la thérapie par inhibiteur du SGLT2



Diminue le risque de défaillance rénale (nécessitant une dialyse ou une greffe)



Diminue le risque ou la fréquence d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque



Diminue le risque de décès de maladie cardiaque



Aide à atteindre les objectifs de pression artérielle



Aide à atteindre les objectifs d'HbA1c



Effet amaigrissant